

Orchidées : COCHENILLES FARINEUSES

DESCRIPTION

Les cochenilles farineuses ressemblent à de petits morceaux de coton blanc de quelques millimètres. Ces insectes s'installent partout où ils sont difficiles à éradiquer : au creux de la fleur, autour du labelle, sous les cuticules des nœuds des tiges florales, à l'aisselle et au revers des feuilles.

NETTOYAGE

Dès que vous repérez la présence de ces insectes indésirables, isolez la plante immédiatement. Nettoyez ce que vous pouvez avec un coton-tige imbibé d'alcool à brûler ou d'alcool à 90°. Si la quantité de parasites est importante sur le feuillage, lavez la plante à l'eau tiède dans l'évier en n'hésitant pas à vous aider d'une brosse à dents douce pour atteindre les parasites. Si certaines cochenilles restent inaccessibles, délogez-les à l'aide du jet d'eau d'un pulvérisateur mis sous pression. Eventuellement, ayez le courage de couper la hampe florale, si vous avez déjà assez à faire avec les insectes présents sur le feuillage. Quelques jours plus tard, regardez si de nouvelles cochenilles nées d'œufs éclos entre temps seraient apparues. Supprimez-les.

TRAITEMENT

Ce grand nettoyage, même effectué soigneusement, peut s'avérer insuffisant. Munissez-vous alors d'un insecticide spécifique anti-cochenilles pour plantes vertes et effectuez 3 traitements à intervalle de 7 jours.

Rincez les feuilles à l'eau tiède 15 jours après le dernier traitement.

Puis continuez à surveiller l'apparition éventuelle de nouveaux insectes pendant plusieurs semaines car tous les œufs n'auront peut-être pas été détruits. Si vous n'agissez pas de façon radicale, ces parasites auront tôt ou tard raison de votre plante.