



depuis 1886

Orchidée

Prosthechea
de climat tempéré

Concerne : Prosthechea chacaoensis, cochleata, pentotis, radiata, etc..

Origine : Amérique centrale et du sud.

COMMENT L'ENTREtenir

Chaleur et lumière : placez le Prosthechea dans votre intérieur (15-22°C), devant une fenêtre bien exposée, à moins d'un mètre, qu'elle profite au maximum du peu de lumière disponible en hiver. En été, tamisez par un voilage, ou sortez-la au jardin à l'ombre si la plante n'est pas en fleurs.

Arrosage : abondant, à l'eau non calcaire, le matin, tous les 8 à 10 jours. La quantité d'eau apportée doit être au moins égale au volume du pot. Faites bien égoutter et ne laissez pas d'eau dans la soucoupe.

Fertilisation : tous les deux arrosages, faites suivre l'arrosage d'un passage d'engrais à dose faible. Utilisez de l'engrais croissance (type HAKAPHOS N.P.K. 15.10.15) pendant la croissance de la nouvelle pousse puis de l'engrais floraison (type HAKAPHOS N.P.K. 8.12.24) dès que le nouveau pseudobulbe est formé. Pour Prosthechea cochleata, qui fleurit pendant de nombreux mois, il est possible d'alterner les deux engrais.

Rempotage : tous les deux ans environ, hors période de floraison, lorsque la plante déborde de son pot. Rempoter alors au printemps, dès que la nouvelle pousse apparaît. Choisissez un mélange "spécial orchidées" à base d'écorce de pin; imprégnez-le d'eau la veille. Supprimez les racines mortes et éventuellement un ou deux des plus anciens pseudobulbes. Prenez un pot d'un diamètre égal ou supérieur de 2 à 4 cm au pot que vous retirez suivant l'espacement des pseudobulbes. Ne placez pas la plante au centre du pot mais excentrée de façon que les nouvelles pousses puissent se développer. Tassez fortement le mélange. Pendant le mois qui suit, contentez-vous de brumiser la surface du pot tous les jours. Reprenez ensuite arrosage et fertilisation. Vous pouvez profiter du rempotage pour diviser le Prosthechea en laissant au moins quatre pseudobulbes et une ou plusieurs pousses.

COMMENT LA FAIRE REFLEURIR

Après la floraison, couper la tige florale près de son point de naissance.

La condition essentielle de la floraison est la vigueur de la nouvelle pousse qu'une bonne exposition à la lumière et une fertilisation appropriée aident à se développer jusqu'à la taille adulte.

Nota : les orchidées du genre Prosthechea appartenaient auparavant au genre Encyclia.

VACHEROT & LECOUFLE www.lorchidee.fr

29, rue de Valenton 94470 Boissy St Léger - FRANCE

Tél. 01.45.69.10.42 contact@lorchidee.fr